

III Pesguard® Professional

Pesguard® CT 2.6



Clothianidin (Κλοθιανιντίν) 2,6%
Υγρό παχύρρευστο (AL)

Εγγυημένη σύνθεση: **Clothianidin** 2,6% β/ο (νεονικοτινοειδές)
(Z)-9-tricosene 0,05% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 97,24% β/β

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφ.: ΤΠ18-0123/01.07.2014


ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ για την καταπολέμηση της οικιακής μύγας
σε κτηνοτροφικούς χώρους

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:
500 κ.εκ.

SUMITOMO CHEMICAL

Κάτοχος της έγκρισης:
SUMITOMO CHEMICAL (U.K.) Plc.
Fulham Palace Road, London, W6 8JA
Ηνωμένο Βασίλειο

01/2014-7



Πέσγκαρντ ΣιΤι 2,6: Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση της οικιακής μύγας σε κτηνοτροφικούς χώρους.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Ετοιμόχρηστο προϊόν για δολωματική εφαρμογή - Επίχρισμα.

Το Pesguard® CT 2,6 μπορεί να τοποθετηθεί με πινέλο ή βούρτσα ως έχει, χωρίς διάλυση, σε επιφάνεια ή σημεία όπου κάθονται οι μύγες (γωνίες, παράθυρα κ.τ.λ.). Επίχρίστε μ' ένα πινέλο ή μικρή βούρτσα για επιφάνεια στάβλου ή ορνιθώνα 200 τμ, συνολικά 60 σημεία διαστάσεων 10x30 εκ., όπου συχνάζουν και επικάθονται οι μύγες (δοκάρια, παράθυρα, πλαίσια παραθύρων, φωτιστικά, κολώνες, χωρίσματα κ.τ.λ.) σε ύψος, που δεν προσεγγίζεται από τα εκτρεφόμενα ζώα. Αν δεν υπάρχουν αρκετές τέτοιες διαθέσιμες επιφάνειες ή δεν είναι αποδεκτός ένας πιθανός ελαφρύς μεταχρωματισμός των επιφανειών, εφαρμόστε τότε το προϊόν σε ανάλογο αριθμό χαρτονιών και από τις δύο πλευρές, μεγέθους περίπου 15x20 εκ., και κρεμάστε τα από την οροφή σε ύψος που δεν τα φτάνουν τα εκτρεφόμενα ζώα. Σε περίπτωση ρύπανσης του δολώματος, πρέπει αυτό να αντικαθίσταται ή να επαναλαμβάνεται η εφαρμογή.

Ψεκασμός.

Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταπολέμηση της μύγας και με ψεκασμό. Ανακατέψτε σε 1 λίτρο νερού 500 κ.εκ. προϊόντος. Το εναιώρημα επαρκεί για ψεκασμό περίπου 20 τμ και πρέπει να εφαρμοστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να προστατεύει στάβλους ή ορνιθώνες με επιφάνεια 200 τμ. Ψεκάστε σε επιφάνειες όπου συχνάζουν και κάθονται οι μύγες (όπως τοίχοι, οροφή, δοκάρια, κολώνες, πλαίσια θυρών και παραθύρων) και σε ύψος που δεν προσεγγίζεται από τα εκτρεφόμενα ζώα. Χρησιμοποιείτε όλο το εναιώρημα την ημέρα της παρασκευής του. Διάρκεια δράσης: 6-8 εβδομάδες. Μην τον εφαρμόζετε σε επιφάνειες βρώμικες ή πορώδεις ή σε φρεσκοασπρισμένους τοίχους.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Κτηνοτροφικοί χώροι (στάβλοι, πτηνοτροφεία, κ.τ.λ.).

ΣΤΟΧΟΙ: Οικιακή μύγα (*Musca domestica*).

ΔΟΣΗ: 500 κ.εκ. / 200 τμ επιφάνειας στάβλου ή ορνιθοτροφείου.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.



Υπεύθυνος για τη διάθεση στην ελληνική αγορά:

ΔΑΦΝΗ Agrotrade ΜΕΠΕ

Ιακωβίδου 50, 111 43 Αθήνα

Τηλ: 2108104490, 2102110890 Φαξ: 2108104491

e-mail: dafnagro@otenet.gr • www.dafnagro.gr



Προσοχή

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3 (2H)-one

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα
Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 21 07793777

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ: Επιτρέπεται η πώληση του μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

Ο μέγιστος συνιστώμενος χρόνος αποθήκευσης είναι 3 χρόνια, στην κλειστή του συσκευασία, σε δροσερό ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος.

ΗΜΕΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε επί της συσκευασίας.